

8 සත්ත්ව පාලනය

සත්ත්ව පාලනයේ වැදගත්කම

සත්ත්ව වර්ගීකරණය




H.K.S.P. Kumarasinghe
(BASc.Sp (Animal Science))
R/Egoda Waleboda Vidyalaya
R/Samanpura Siddhartha Vidyalaya

සත්ත්ව පාලනයේ වැදගත්කම

- ප්‍රෝටීන ප්‍රභවයක් ලෙස යොදාගත හැකි වීම.
- රැකියා සැපයිය හැකි වීම.
- සත්ත්ව නිවාසවල ඉතිරුණු මලපහ ආදිය උසස් තත්ත්වයේ කාබනික පොහොරක් ලෙස භාවිත කළ හැකි වීම.
- කෘෂි බෝග වගාව සිදු කළ නොහැකි භූමි සත්ත්ව පාලනයට යොදාගත හැකි බැවින් එවැනි භූමි ප්‍රදේශ වලින් ප්‍රයෝජන ගත හැකි වීම.

- ජීව වායු නිෂ්පාදනයට.
- පවුලේ පෝෂණයට හා අමතර ආදායමක් ලබාගැනීමට අවස්ථාව සැලසීම.
- කෘෂි කාර්මික අතුරුඵල සත්ත්ව ආහාර ලෙස යොදා ගැනීමට හැකිවීම.
- සත්ත්ව පාලනයේ අතුරුඵල වන ඇට, කුර, හම් ආදිය කර්මාන්ත සඳහා අමුද්‍රව්‍ය ලෙස යොදාගත හැකි වීම.

ශ්‍රී ලංකාවේ සත්ව පාලනයේ වර්තමාන තත්වය



ශ්‍රී ලංකාව තුළ සත්ත්ව පාලනය දියුණු කිරීමට පවතින විභව





ශ්‍රී ලංකාවේ දේශගුණික කලාප


තෙත් කලාපය = > වාර්ෂික වර්ෂාපතනය මි.මි. 2500


අතරමැදි කලාපය = වාර්ෂික වර්ෂාපතනය මි.මි. 1750 - 2500

වියළි කලාපය = < වාර්ෂික වර්ෂාපතනය මි.මි. 1750









ගොවිපොළ සතුන් තේරීම

සත්ත්ව වර්ගීකරණය


සම්භවය

ප්‍රයෝජනය
අනුව

ගවයින් වර්ගීකරණය

එළ ගවයින් සම්භවය වූ රට අනුව

යුරෝපීය ගව වර්ග




ඉන්දීය ගව වර්ග



ඉන්දිය ගව වර්ග (<i>Bos indicus</i>)	යුරෝපීය ගව වර්ග (<i>Bos taurus</i>)
● ඉන්දිය සම්භවයක් සහිත ය. ● පරිසරයේ වැඩි උෂ්ණත්ව වලට ඔරොත්තු දේ. ● ශරීරය සාපේක්ෂව කුඩා ය. ● මොල්ලිය මනාව වර්ධනය වී ඇත. ● තැල්ල, පෙකණි පෙත්ත මනාව වර්ධනය වී ඇත. ● ශරීරය පිටුපස රවුම් ය. ● ශ්වේද ග්‍රන්ථි වැඩි ය. ● හම ඇදෙන සුළුය. සෙලවේ. ● කිණිකුළු උණට හා බාහිර පරපෝෂිතයන්ට ඔරොත්තු දේ. ● පිරිමි සතුන් බර ඇඳීමට සුදුසු ය. ● කිරි නිෂ්පාදනය අඩු ය. ● ලෝම කෙටි ය.	● යුරෝපීය සම්භවයක් සහිත ය. ● වැඩි උෂ්ණත්වයට ඔරොත්තු නොදේ. ● ශරීරය සාපේක්ෂව විශාල ය. ● මොල්ලිය මනාව වර්ධනය වී නැත. ● තැල්ල, පෙකණි පෙත්ත මනාව වර්ධනය වී නැත. ● ශරීරයේ පිටුපස රවුම් නැත. ● ශ්වේද ග්‍රන්ථි අඩු ය. ● හම ඇගට තදවී ඇත. ● කිණිකුළු උණට හා බාහිර පරපෝෂිතයන්ට ඔරොත්තු නොදේ. ● පිරිමි සතුන් අභිජනන කාර්යයන්ට යෝග්‍ය ය. ● කිරි නිෂ්පාදනය වැඩි ය. ● ලෝම දිග ය.

මොළේලිය




කැලේ

පෙකණි පෙත්ත

සුරෝෂිය ගව වර්ග

ඉන්දීය ගව වර්ග



එළ ගවයින්නේ ලබාගන්නා ප්‍රයෝජන අනුව

- කිරි ලබා ගැනීම සඳහා



- මස් ලබා ගැනීම සඳහා



• ශ්‍රමය / බර වැඩ සඳහා



කිලාරි

කාන්ගායම්



තර්පකාර්

ප්‍රියියන් (Friesian)

❖ ඉහළ ම කිරි නිෂ්පාදනයක් (6000l - 7000l)

❖ සම්භවය නෙදර්ලන්තයයි

❖ ශරීරය සුදු පුල්ලි සහිතයි



❖ අං දිග ය

❖ ශරීර ප්‍රමාණය විශාල ය

❖ මේද ප්‍රතිශතය 3.5 - 4.0 %

❖ ලංකාවේ උඩරට තෙත් කලාපයට වඩාත් යෝග්‍ය ය

❖ දේශීය ගවයින් හා අභිජනනය කිරීමෙන් උසස් දෙමුහුම් සතුන් ලබා ගත හැකිය



අයර්ෂයර්

- ❖ නිපදවන කිරි ප්‍රමාණය (4500l - 6000l)
- ❖ සම්භවය බ්‍රිතාන්‍යයේ අයර්ෂයර්
- ❖ රතු හෝ දුඹුරු පුල්ලි සහිත සුදු පැහැති ගර්භයකින් යුක්තය
- ❖ නමුත් තද දුඹුරු හෝ සුදු පැහැති ගවයන්ද ඇත
- ❖ අං දිග ය.
- ❖ මේද ප්‍රතිශතය 4.0 % ක්
- ❖ ලංකාවේ උඩරට තෙත් කලාපයට වඩාත් යෝග්‍ය ය




ජර්සි (Jersey)

- ❖ යුරෝපය අවට ජර්සි දූපත
- ❖ ගරීර වර්ණය දුඹුරු හෝ තඹ හෝ අළු පැහැති විය හැකිය.
- ❖ හොඹ කළු පාට ය.
- ❖ ගරීරය ප්‍රමාණයෙන් කුඩා ය.
- ❖ මෙම සතුන්ගේ අං උල් වී ඉදිරියට නැමී ඇත.
- ❖ ඇස ඉදිරියට තෙරා ඇත
- ❖ නිපදවන කිරි ප්‍රමාණය **4000l - 4500l**
- ❖ අඩංගු මේද ප්‍රතිශතය **4.5% - 5.4 %**



සහිවාල් (Sahiwal)

- ❖ පකිස්ථානයේ සම්භවය
- ❖ කිරි ලබා ගැනීම
- ❖ විශාල ශරීරයකින් යුක්ත වීම
- ❖ ශරීර වර්ණය ලා දුඹුරු
- ❖ නිපදවන කිරි ප්‍රමාණය 2000l 2500l
- ❖ මේද ප්‍රතිශතය 4.5%
- ❖ මොල්ලියක් හා එල්ලා වැටෙන තැල්ලක් ඇත
- ❖ වියළි කලාපයේ ද මැදරට හා පහතරට වියළි කලාපයට යෝග්‍ය ය



රතු සින්දි (Red Sindhi)

- ❖ පකිස්ථානයේ කරවිවි
- ❖ ද්විකාර්ය වේ (කිරි හා ශ්‍රමය සඳහා)
- ❖ ශරීර වර්ණය රතු හෝ දුඹුරු පැහැති ය
- ❖ නිපදවන කිරි ප්‍රමාණය 2000l
- ❖ මේද ප්‍රතිශතය 4.5% - 5.0
- ❖ මොල්ලිය විශාල ය
- ❖ පාර්ශවික ව දිගුවක් වූ අං ඇත



දේශීය ගව වර්ගය

- ❖ වියලි කලාපයේ ස්වභාවික තෘණ භූමි වලය.
- ❖ ශරීර වර්ණය කළු හෝ රතු වේ. සුදු පැහැති පුල්ලි දක්නට ඇත.
- ❖ එක් මුරයකදී **කිරි ලිටර් 600 - 700 ක්** පමණ ගත හැකිය
- ❖ කිරි හා මස් ලබා ගැනීමට මෙන්ම බර ඇදීම සි සෑම ආදි කටයුතු සඳහා ද යෝග්‍ය ය .
- ❖ උසස් ගව වර්ග සමග දෙමුහුම් කිරීමෙන් දේශීය සතුන් වැඩි දියුණු කළ හැකිය



Thank You



Contact through
sajeeeee89@gmail.com