



தேசிய வெளிக்கள நிலையம் தொண்டைமானாறு
மூன்றாம் தவணைப் பரீட்சை - 2023
National Field Work Centre, Thondaimanaru.
3rd Term Examination - 2023

இணைந்த கணிதம் – A
Combined mathematics – A

Three Hours

10

T

A

Gr -12 (2023)

அறிவுறுத்தல்கள்:

கூட்டெண்

- பகுதி A இன் எல்லாவினாக்களுக்கும் விடைஎழுதுக. ஒவ்வொரு வினாவுக்கும் விடைகளைத் தரப்பட்ட இடத்தில் எழுதுக. மேலதிக இடம் தேவைப்படுமெனின், நீர் மேலதிகத் தாள்களைப் பயன்படுத்தலாம்.
- பகுதி B இல் உள்ள 7 வினாக்களில் விரும்பிய 5 வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக.
- ஒதுக்கப்பட்ட நேரம் முடிவடைந்ததும் பகுதி A ஆனது பகுதி B யிற்கு மேலே இருக்கக் கூடியதாக இரு பகுதிகளையும் இணைத்துப் பரீட்சை மண்டப மேற்பார்வையாளரிடம் கையளிக்க.
- வினாத்தாளின் பகுதி B யை மாத்திரம் பரீட்சை மண்டபத்திலிருந்து வெளியே எடுத்துச் செல்வதற்கு அனுமதிக்கப்படும்.

இணைந்த கணிதம் I		
பகுதி	வினா எண்	கிடைத்த புள்ளிகள்
A	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
B	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
வினாத்தாள் I இன் மொத்தம்		

இணைந்த கணிதம் I

இணைந்த கணிதம் II

இறுதிப் புள்ளிகள்

பகுதி A

1. $\frac{3x}{(x-1)(x+2)}$ ஐப் பகுதிப்பின்னங்களில் எடுத்துரைக்க. இதிலிருந்து $\frac{3}{(x-1)(2x+1)}$ ஐயும் பகுதிப்பின்னங்களில் எடுத்துரைக்க.

[illegible]

2. ஒரே வரிப்படத்தில் $y = |3x - 2|$, $y = 2x$ ஆகியவற்றின் வரைபுகளைப் பரும்படியாக வரைக. இதிலிருந்து அல்லது வேறு விதமாக, சமனிலி $3|x - 2| \leq 2x$ ஐத் திருப்தியாக்கும் x இன் எல்லா மெய்ப் பெறுமானங்களையும் காண்க.

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

3. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{3} - \sqrt{2 + \sin x}}{\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \cos x} = \frac{1}{4\sqrt{3}}$ எனக் காட்டுக.

4. ஒரு வளையி C ஆனது $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ இற்கு $x = 4 \sin 2\theta$, $y = 2 + \cos 4\theta$ என்னும் பரமானச் சமன்பாடுகளினால் தரப்படுகின்றது. $\frac{dy}{dx} = -\sin 2\theta$ எனக் காட்டுக. $\theta = \frac{\pi}{8}$ இல் வளையி C இற்கு வரையப்பட்ட தொடலிக் கோட்டின் சமன்பாடு $x + \sqrt{2}y - 4\sqrt{2} = 0$ எனக் காட்டுக.

5. $0 \leq \theta \leq \pi$ இற்கு சமன்பாடு $(2 \sin \theta - \cos \theta)(1 + \cos \theta) = \sin^2 \theta$ ஐத் தீர்க்குக.

6. கிடைத்தரையில் இருந்து புவியீர்ப்பின் கீழ் நிலைக்குத்தாக மேல் நோக்கி $\sqrt{2gh}$ வேகத்துடன் துணிக்கை ஒன்று எறியப்படும் கணத்தில் கிடைத் தரையில் இருந்து h உயரத்தில் உள்ள புள்ளியில் இருந்து புவியீர்ப்பின் கீழ் ஓய்வில் இருந்து ஒரு துணிக்கை விழவிடப்படுகின்றது இரு துணிக்கைகளின் கதிகள் சமனாவதற்கு எடுக்கும் நேரத்தை காண்க. அப்போது அவை ஒன்றை ஒன்று சந்திக்கும் என உய்த்தறிக.

7. கிடைத்தரையில் இருந்து a உயரமான புள்ளியில் இருந்து கிடையுடன் 30° திசையில் மேல் நோக்கி u வேகத்துடன் எறியப்படும் துணிக்கை கிடைத்தரையை $\sqrt{3ag}$ கதியில் அடிப்பின் துணிக்கையின் எறியல் கதி $\sqrt{ag}$ எனக் காட்டுக. துணிக்கை தரையை அடிக்கும் திசையைக் காண்க.

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

8. ஒரு இலேசான நீளா இழையின் நுனிகளுக்கு P, Q ஆகிய துணிக்கைகள் இணைக்கப்பட்டு படத்தில் காட்டப்பட்டவாறு ஒரு ஒப்பமான இலேசான கப்பியின் மேலாக இழையானது சென்று இறுக்கமாகவும் கப்பியுடன் தொடுகையுறாத இழையின் பகுதிகள் நிலைக்குத்தாகவும் இருக்க தொகுதி ஓய்வில் இருந்த விடப்படுகின்றது. P, Q ஆகிய துணிக்கைகளின் திணிவுகளுக்கிடையிலான விகிதம் $2:3$ ஆகவும் இழையில் உள்ள இழுவை $24mg$ ஆகவும் இருப்பின் துணிக்கைகளின் ஆர்முடுகளையும் அவற்றின் திணிவுகளையும் காண்க.



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

9. புள்ளி O குறித்து தளம் ஒன்றில் A, B ஆகிய புள்ளிகளின் தானக் காவிகள் முறையே $2\vec{a}, 3\vec{b}$ ஆகும். நேர்கோடு AB இல் உள்ள எந்த ஒரு புள்ளி C இன் தானக்காவி ஆனது $3\alpha\vec{b} + 2(1 - \alpha)\vec{a}$ என்னும் வடிவில் எடுத்துரைக்கப்படலாம் எனக் காட்டுக. $|\vec{a}| = 3, |\vec{b}| = 2$ எனில் OC செங்குத்து AB ஆகுமாறு AB இல் உள்ள புள்ளி C இன் தானக்காவியை குற்றுப்பெருக்கத்தை பயன்படுத்திக் காண்க.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

10. W நிறையும் $4a$ நீளமும் உடைய ஒரு சீரான கோல் AB இன் ஒரு முனை A ஆனது ஒரு ஒப்பமான நிலைக்குத்து சுவரை தொட்டுக்கொண்டும் $AC : CB = 1 : 3$ ஆகுமாறு கோலில் உள்ள புள்ளி C ிற்கு ஒரு இலேசான நீளா இழையின் ஒரு நுனி இணைக்கப்பட்டு இழையின் மறு நுனி A இற்கு மேலே சுவரில் உள்ள புள்ளி D இற்கு இணைக்கப்பட்டும் கோலானது சமனிலையில் உள்ள போது இழையில் உள்ள இழுவை $2W$ எனில் சுவரினால் கோலில் ஏற்படுத்தப்படும் மறுதாக்கம், கோல் கிடையுடன் ஆக்கும் கோணம், இழையின் நீளம் ஆகியவற்றைக் காண்க.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



தேசிய வெளிக்கள நிலையம் தொண்டைமானாறு
முன்றாம் தவணைப் பரீட்சை - 2023
National Field Work Centre, Thondaimanaru.
3rd Term Examination - 2023

இணைந்த கணிதம் - B
Combined mathematics - B

Gr -12 (2023)

10

T

B

11. (a) $f(x) = x^2 + (2k + 1)x + 2k - 5$ எனக் கொள்வோம்; இங்கு $k \in \mathbb{R}$.

$f(x) = 0$ இன் பிரித்துக்காட்டியை k சார்பில் எழுதுக. **இதிலிருந்து**, சமன்பாடு $f(x) = 0$ இற்கு வேறுவேறான மெய்ம் மூலங்கள் இருக்கின்றதெனக் காட்டுக.

$f(x) = 0$ இன் மூலங்கள் α, β எனவும் கொள்வோம். $\alpha + \beta, \alpha\beta$ ஆகியவற்றை k சார்பில் எழுதுக. α, β ஆகிய இரண்டும் மறையாக இருக்குமாறு k இன் பெறுமானங்களைக் காண்க.

இப்போது $k > 3$ எனக் கொள்வோம். $\sqrt{\frac{\alpha}{\beta}}, \sqrt{\frac{\beta}{\alpha}}$ ஆகியவற்றை மூலங்களாகக் கொண்ட இருபடிச் சமன்பாட்டை k சார்பில் காண்க.

இதிலிருந்து, $f\left(-\frac{2}{x}\right) = 0$ இன் மூலங்கள் γ, δ எனின், $\sqrt{\frac{2\gamma}{\delta}}, \sqrt{\frac{2\delta}{\gamma}}$ ஆகியவற்றை மூலங்களாகக் கொண்ட இருபடிச் சமன்பாட்டை k சார்பில் காண்க.

(b) $f(x) = 3x^3 + ax^2 + x + b$ எனவும் $g(x) = x^3 + cx^2 + ax + 1$ எனவும் கொள்வோம்; இங்கு $a, b, c \in \mathbb{R}$ ஆகும். $f(x)$ ஆனது $x + 1$ இனால் வகுக்கப்படும்போது மீதி 1 எனவும் $g(x)$ ஆனது $x^2 + x - 2$ இனால் வகுக்கப்படும்போது மீதி $2x + 5$ எனவும் தரப்பட்டுள்ளன. a, b, c ஆகியவற்றின் பெறுமானங்களைக் காண்க.

மேலும் a, b, c ஆகியவற்றுக்கான இப்பெறுமானங்களுடன் எல்லா $x \in \mathbb{R}$ இற்கும் $3g(x) - f(x) \geq -\frac{25}{28}$ எனக் காட்டுக.

12. (a) $x \neq 0$ இற்கு $f(x) = \frac{(x+2)(x-1)}{x^2}$ எனக் கொள்வோம்.

$x \neq 0$ இற்கு $f(x)$ இன் பெறுதி $f'(x)$ ஆனது $f'(x) = \frac{4-x}{x^3}$ இனால் தரப்படுகின்றது எனக் காட்டுக.

இதிலிருந்து, $f(x)$ அதிகரிக்கும் ஆயிதையையும் குறைகின்ற ஆயிதையையும் காண்க. மேலும் $f(x)$ இன் திரும்பற் புள்ளியின் ஆள்கூறுகளையும் காண்க.

$x \neq 0$ இற்கு $f(x)$ இன் இரண்டாம் பெறுதி $f''(x)$ ஆனது $f''(x) = \frac{2(x-6)}{x^4}$ எனத் தரப்பட்டுள்ளது. $y = f(x)$ இன் வரைபின் விபத்திப் புள்ளியின் ஆள்கூறுகளைக் காண்க.

$y = f(x)$ இன் வரைபை அச்சை வெட்டும் புள்ளிகள், அணுகுகோடுகள், திரும்பற் புள்ளி, விபத்திப் புள்ளி ஆகியவற்றைக் காட்டிப் பரும்படியாக வரைக.

(b) $ABCD$ என்பது ஒரு செவ்வகமாகும். மீற்றரில் அளக்கப்படும் அதன் பக்கங்களின் நீளங்கள் $AB = a$, $BC = b$ இனால் தரப்பட்டுள்ளன. பக்கம் CD மீது P என்னும் புள்ளி உள்ளது. $PA^2 + PB^2$ ஆனது குறைந்தபட்சமாக இருப்பதற்கு P ஆனது CD யின் நடுப்புள்ளியாக இருக்க வேண்டும் எனக் காட்டுக.

13. புள்ளி $P \equiv (x_1, y_1)$ இலிருந்து, நேர்கோடு $l \equiv ax + by + c = 0$ இற்குள்ள செங்குத்துத் தூரம் $\frac{|ax_1+by_1+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$ என்பதை நிறுவுக.

முக்கோணி ABC இன் இரு உச்சிகள் $A \equiv (1, 5)$, $C \equiv (3, 4)$ ஆகும். பக்கம் AB ஆனது $2x - 5y + 23 = 0$ என்னும் கோட்டின் மீது கிடக்கின்றது.

பக்கம் AC யின் நீளத்தையும் A, C இனாடு செல்லும் நேர்கோட்டின் சமன்பாட்டையும் காண்க.

A, B இனாடாகச் செல்லும் கோட்டின் மீதுள்ள புள்ளி எதனதும் ஆள்கூறுகள் $(5t + 1, 2t + 5)$ இனால் தரப்படுகின்றதெனக் காட்டுக.

முக்கோணி ABC யின் பரப்பளவு $4\frac{1}{2}$ சதுர அலகுகள் எனவும் முக்கோணி முழுவதும் முதலாம் கால்வட்டத்தில் கிடக்கின்றது எனவும் மேலும் தரப்பட்டுள்ளன. உச்சி B இலிருந்து AC இற்கான செங்குத்துத் தூரத்தைக் கருதுவதன் மூலம் உச்சி B யின் ஆள்கூறுகளைக் காண்க.

B, C இனாடு செல்லும் நேர்கோட்டின் சமன்பாட்டையும் காண்க.


14. (a) $\sin(A + B)$ இன் விரிவை எழுதுக. இதிலிருந்து, $\cos(A + B)$ இன் விரிவை பெறுக.

A, B இற்குப் பொருத்தமான பெறுமானங்களை இடுவதன் மூலம் $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$ எனவும் $\cos 2\theta = 2\cos^2\theta - 1$ எனவும் காட்டுக. $\cos 3\theta = \cos(2\theta + \theta)$ என எழுதுவதன் மூலம் $\cos 3\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos \theta$ எனக் காட்டுக. இறுதியாகப் பெற்ற முடிவில் θ இற்குப் பொருத்தமான பெறுமானத்தை இடுவதன் மூலம் $\cos \frac{\pi}{12}$ என்பது சமன்பாடு $4\sqrt{2}x^3 - 3\sqrt{2}x - 1 = 0$ இன் ஒரு மூலம் எனக் காட்டுக.

$4\sqrt{2}x^3 - 3\sqrt{2}x - 1 = (\sqrt{2}x + 1)(4x^2 - 2\sqrt{2}x - 1)$ என்பதை வாய்ப்புப் பார்க்க. $\cos \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}$ என்பதை உய்த்தறிக்க.

(b) வழக்கமான குறிப்பீட்டில் ஒரு முக்கோணி ABC இற்கு சைன் நெறியைக் கூறுக.

உருவில் காட்டப்பட்ட முக்கோணி ABC இல் AB யின் நடுப்புள்ளி D ஆகும். $\hat{BAC} = \hat{BCD} = \beta$ உம் $\hat{BDC} = \alpha$ உம் ஆகும். முக்கோணிகள் ACD, BCD ஆகியவற்றிற்கு சைன்



நெறியைப் பிரயோகிப்பதன் மூலம் $\frac{\sin(\alpha+\beta)}{\sin\beta} = \frac{\sin\alpha}{\sin(\alpha-\beta)}$ எனக்

காட்டுக. மேலும் $\tan^2\beta = \frac{\sin^2\alpha}{1+\cos^2\alpha}$ எனவும் காட்டுக.

(c) சமன்பாடு $\sin^{-1}\left(\frac{e^x}{5e^x-6}\right) + \cos^{-1}\left(\frac{1}{e^x}\right) = \frac{\pi}{2}$ ஐத் தீர்க்க.


15.a) தரைக்கு மேலே உயரம் $2a$ இல் உள்ள புள்ளி ஒன்றில் இருந்து கதி $2gT$ உடன் கிடையாக எறியப்படும் துணிக்கை புவியீர்ப்பின் கீழ் சுயாதீனமாக இயங்குகின்றது. இங்கு T மாறிலி ஆகும். துணிக்கை தரையை அடிக்கும் வரைக்குமான துணிக்கையின் கிடை, நிலைக்குத்து இயக்கங்களுக்கான வேகநேர வரைபுகளை தனித்தனியாக வரைக. துணிக்கை தரையை அடிக்கும் போது எறியற் புள்ளியில் இருந்தான கிடைத்தூரம் $4gT^2$ எனில் வேக நேர வரைபுகளைப் பயன்படுத்தி

- துணிக்கை தரையை அடிக்க எடுக்கும் நேரத்தை T சார்பில் காண்க
- துணிக்கை தரையை அடிக்கும் வேகத்தைக் காண்க.
- a ஐ g, T சார்பில் காண்க.

b) ஒருகுறித்த கணத்தில் A, B என்னும் கப்பல்கள் துறைமுகம் H இல் இருந்து முறையே 12 km மேற்கிலும் $4\sqrt{3} \text{ km}$ வடக்கிலும் உள்ளன. கப்பல் A ஆனது 12 km/h சீரான கதியுடன் கிழக்கு நோக்கியும் கப்பல் B ஆனது $12\sqrt{3} \text{ km/h}$ சீரான கதியுடன் தெற்கு நோக்கியும் ஒரே நேரத்தில் பயணிக்கின்றன.

- சார்பு வேகக் கோட்பாட்டை பயன்படுத்தி வேக முக்கோணி வரைவதன் மூலம் B சார்பாக A இன் வேகத்தைக் காண்க.
- B சார்பாக A இன் பாதையை வரைக
- A, B க்கு இடையிலான மிகக் கிட்டிய தூரத்தைக் காண்க.
- மிகக் கிட்டிய தூரத்தை அடைய எடுக்கும் நேரத்தைக் காண்க.

16)



உருவில் ABC ஆனது $AC = BC$ ஆகும்படியும் $\angle C = 60^\circ$ ஆகும்படியும் உள்ள 5 m திணிவுள்ள ஓர் ஒப்பமான சீரான ஆப்பின் திணிவுமையத்தின் ஊடான நிலைக்குத்து குறுக்கு வெட்டாகும். CA, CB என்பன அவற்றைக் கொண்டுள்ள முகங்களின் அதிஉயர் சரிவுக் கோடுகளாகும். முகம் AB ஆனது ஒரு ஒப்பமான கிடை நிலத்தை தொட்டுக்கொண்டிருக்க முறையே $3 \text{ m}, m$ திணிவுள்ள P, Q ஆகிய துணிக்கைகள் படத்தில் காட்டியவாறு ஒரு இலேசான நீளா இழையின் நுனிகளுக்கு இணைக்கப்பட்டு இழையானது

உச்சி C இல் நிலைப்படுத்தப்பட்ட ஒப்பமான இலேசான கப்பியின் மேலாகச் சென்று இழை இறுக்கமாகவும் இழையின் பகுதிகள் அதி உயர் சரிவுக் கோடுகள் வழியே இருக்குமாறும் பிடிக்கப்பட்டு தொகுதி மெதுவாக விடுவிக்கப்படுகின்றது. தொடரும் இயக்கத்தில் ஒரு குறித்த கணத்தில் ஆப்பானது புள்ளி O இல் இருந்து x தூரத்திலும் துணிக்கை P ஆனது C இல் இருந்து அதிஉயர் சரிவுக்கோட்டின் வழியே y தூரத்திலும் காணப்படின்.

i) ஆப்பு , துணிக்கைகளில் தாக்கும் விசைகளைக் குறிக்க.

ii) ஆப்பு , துணிக்கைகளின் ஆர்முடுகல்களை $\ddot{x}, \ddot{y}$ சார்பில் எழுதுக.

iii) ஆப்பின் ஆர்முடுகலின் பருமன் $\frac{\sqrt{3}}{16} g$ எனவும் துணிக்கை P இன் ஆர்முடுகலின் பருமன் $\frac{\sqrt{201}}{32} g$ எனவும் காட்டுக.

iv) தரையினால் ஆப்பின் மீது தாக்கும் மறுதாக்கத்தின் பருமனைக் காண்க.

v) துணிக்கை P, Q இன் மீது ஆப்பினால் கொடுக்கப்படும் மறுதாக்கங்களைக் காண்பதற்கான சமன்பாடுகளைப் பெறுக.

17.

a) i) $\underline{a}, \underline{b}$ என்பன பூச்சியமற்ற சமாந்தரமற்ற காவிகளாகவும் $\alpha \underline{a} + \beta \underline{b} = \underline{0}$ ஆகவும் இருப்பின் $\alpha = 0, \beta = 0$ எனக் காட்டுக

ii) புள்ளி O குறித்து A, B என்ற புள்ளிகளின் தானக்காவிகள் முறையே $2\underline{a}, \underline{b} - \underline{a}$ ஆகும். $BM:MA = 1:2$ ஆகுமாறு AB இல் உள்ள புள்ளி M ஆகும். OA இற்கு சமாந்தரமாக B ஊடாக வரையும் நேர்கோடு நீட்டிய OM ஐ C இல் சந்திக்கிறது. இங்கு $OM = \lambda OC$ ஆகும்

I. $\overrightarrow{AB}$ ஐ $\underline{a}, \underline{b}$ சார்பாக காண்க

II. $\overrightarrow{MB}$ ஐ $\underline{a}, \underline{b}$ சார்பாக காண்க

III. முக்கோண காவிக் கூட்டல் விதியை பயன்படுத்தி $\overrightarrow{OM}$ ஐ $\underline{a}, \underline{b}$ சார்பாக காண்க.

IV. $\overrightarrow{BC}$ ஐ யாதாயினும் பரமானம் $\mu, \underline{a}, \underline{b}$ எழுதுக.

V. $OM = \lambda OC$ ஐ பயன்படுத்தி $\overrightarrow{OM}$ ஐ $\lambda, \mu, \underline{a}, \underline{b}$ சார்பாக காண்க

VI. III, V ஆகியவற்றை பயன்படுத்தி λ, μ என்பவற்றைக் காண்க

VII. C இன் தானக்காவி மற்றும் $\overrightarrow{BC}$ ஐ எழுதுக.

VIII. $OM:MC$ ஐ உய்த்தறிக.

b) $ABCDEF$ ஆனது பக்க நீளம் $2a$ ஆகவுள்ள ஒழுங்கான அறுகோணி. $\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{ED}, \overrightarrow{DB}, \overrightarrow{BE}$ என்பவற்றின் வழியே முறையே $4, 8, 2, \lambda\sqrt{3}, 6 N$ விசைகள் தாக்குகின்றன. விளையுள்ளனது AD க்கு செங்குத்து எனில்

i. λ ஐக் காண்க.

ii. விளையுளைக் காண்க.

iii. விளையுள் E இனுடாக செல்லும் எனக் காட்டுக

iv. விளையுள் D ஊடாக செல்வதற்கு சேர்க்கப்படவேண்டிய இணையைக் காண்க